

L'arteriopatia periferica (PAD dall'acronimo inglese di Peripheral Artery Disease) è una delle manifestazioni della patologia aterotrombotica insieme alla cardiopatia ischemica e alla patologia cerebrovascolare, ed è tra tutte la più sottostimata e la meno studiata. Tuttavia, dati epidemiologici ci suggeriscono che la prevalenza della PAD sia di poco inferiore, se non simile, a quella della cardiopatia ischemica.

Nonostante numerosi studi abbiano chiaramente indicato come i pazienti affetti da PAD abbiano un rischio significativamente aumentato di infarto acuto del miocardio o di ictus ischemico, la terapia dei pazienti con PAD è basata su evidenze molto meno solide della terapia delle patologie aterotrombotiche più conosciute. Già quando presente in forma asintomatica, la PAD si associa ad un rischio di mortalità a medio-lungo termine significativamente superiore a quello documentato in soggetti liberi da PAD e simile a quello documentato nei pazienti con PAD sintomatica.

Per questo motivo, l'identificazione precoce di questa patologia, e l'applicazione di adeguate strategie di correzione dei fattori di rischio stessi (cessazione del fumo, controllo dell'ipertensione, delle dislipidemie o del diabete) rimane un obiettivo fondamentale da perseguire sia in regime ambulatoriale che nei pazienti ricoverati.



Bari Congressi & Cultura Srl
www.baricongressi.it - www.baricongressi-fad.it
70125, Bari Viale Einaudi 51
Tel. 080.5275628 - 080.9146449
Provider Nazionale ECM nr. 287

ARTERIOPATIA PERIFERICA E CORONAROPATIA: STRATEGIE PER RIDURRE IL RISCHIO DEL PAZIENTE E PATIENT MANAGEMENT IN TEMPO DI COVID-19



18 febbraio 2021
Ore 15.00 - 17.00

**con il contributo
non condizionato di**

WEBCONFERENCE



Bayer